
MATEMÁTICAS 1º ESO






ACADEMIA TAMARGO, S.L.U.

SÍGUENOS EN:



Derechos reservados, prohibida su distribución total o parcial no autorizada

ACADEMIA TAMARGO, S.L.U.





Índice de contenidos

CONTENIDO	
NÚMEROS REALES	5
DEFINICIONES PREVIAS	5
Figura1	5
OPERACIONES CON NÚMEROS REALES	5
POTENCIAS	6
CONSIDERACIONES SOBRE LAS POTENCIAS	6
OPERACIONES CON POTENCIAS	7
DIVISIBILIDAD	7
CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD	
MÁXIMO COMÚN DIVISOR	8
MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO	8
REGLA DE LOS SIGNOS	8
RAZONES DE DOS NÚMEROS	8
PROPIEDAD FUNDAMENTAL DE LAS RAZONES	_
OPERACIONES CON FRACCIONES	
CALCULO DE FRACCIONES GENERATRICES	
NUMEROS MIXTOS	11
JERARQUÍA DE LAS OPERACIONES	11
MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES	12
REGLA DE TRES DIRECTA	12
MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES	12
REGLA DE TRES INVERSA	12
REPARTOS DIRECTAMENTE PROPORCIONALES	13
REPARTOS INVERSAMENTE PROPORCIONALES	13
PORCENTAJES	13
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL	
MEDIDAS DE LONGITUD	13
MEDIDAS DE SUPERFICIE	14
MEDIDAS DE VOLUMEN	14
ACADEMIA TAMARGO S I II	iatamargo com



NÚMEROS REALES

DEFINICIONES PREVIAS

Número real llamaremos a un número que puede ser **racional** o **irracional**, por consiguiente, el conjunto de los números reales es la unión del conjunto de números racionales y el conjunto de números irracionales.

- El conjunto de los números reales es el conjunto de todos los números que corresponden a los puntos de la recta.
- Al conjunto de los números reales es el conjunto de todos los números que pueden expresarse con decimales infinitos periódicos o no periódicos. El conjunto de los números reales es denotado por R.




Figura1

Nota: En la Figura 1 vemos como cada grupo engloba al anterior. Menos en el caso de los números Irracionales.

Ejemplo: El número 5 es natural (N), Entero (Z), Racional (Q) y Real(R)

OPERACIONES CON NÚMEROS REALES

En el conjunto de los números reales se encuentran definidas cuatro operaciones básicas que son: la adición, la multiplicación, la sustracción y la división.

ADICIÓN DE NÚMEROS REALES

Adición de números reales: es una operación que asocia a cada par de números reales a y b, llamados sumandos, un único número real c, llamado suma de a y b la adición es una función definida así:

a+b=c

Ejemplo: 3+5=8

SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS REALES

Sustracción de números reales: Es la operación inversa de la adición, mientras en la adición se dan los sumandos y se trata de calcular la suma.

En la sustracción se da el minuendo y el sustraendo y se trata de calcular la diferencia:

$$m-s=d$$

Ejemplo:
$$3,52-2,1=1,42$$

MULTIPLICACIÓN

Multiplicación de números reales: es una operación que asocia a cada par de números reales a y b, llamados factores; un único número real c, llamado producto de a y b. La multiplicación es una función definida así:

$$a \times b = c$$

Ejemplo:
$$\frac{3}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{4}$$

DIVISIÓN

División de números reales: es la operación inversa de la multiplicación, mientras en la multiplicación se dan los factores y se trata de calcular el producto. En la división se da el producto llamado ahora dividendo y un factor llamado ahora divisor y se trata de calcular el otro factor, llamado cociente.

$$\frac{dividendo}{divisor} = cociente$$

Ejemplo:
$$\frac{6}{3} = 2$$

Nota: Recordemos que la fórmula de la prueba de la división era:

Dividendo = divisor x cociente + resto

POTENCIAS

Potencia de un número: Muestra cuantas veces se usa el número en una multiplicación. Donde al número se le llama base y a las veces que se repite exponente.

Ejemplo: $2^3 = 2x2x2$ (la base es 2 y el exponente 3).

CONSIDERACIONES SOBRE LAS POTENCIAS



1) Toda potencia de exponente 1 es igual a la base.

Ejemplo :
$$a^1 = a$$
 ; $3^1 = 3$

2) Toda potencia de exponente 0, es igual a la unidad.

Ejemplo:
$$a^0 = 1$$
; 3°=1

3) Toda potencia de base uno es igual a la unidad.

Ejemplo:
$$1^3 = 1x1x1 = 1$$

ACADEMIA TAMARGO S.L.U.

ACADEMIA TAMARGO

4) Para obtener potencias de base 10, se escribe la unidad seguida de tantos ceros, como unidades tiene el exponente.

Ejemplo: 10³=1000

5) Al elevar los dos miembros de una igualdad a una potencia, resulta otra igualdad.

$$a = b \Rightarrow a^3 = b^3$$

OPERACIONES CON POTENCIAS

1. El producto de potencias de igual base, es otra potencia que tiene la misma base y como exponente, la suma de los exponentes.

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo:
$$3^2 \times 3^3 = 3^5$$

2. El cociente de potencias de la misma base, es otra potencia que tiene la misma base, y como exponente, la diferencia de los exponentes.

$$a^m:a^n=a^{m-n}$$

$$a^m: a^n = a^{m-n}$$
 Ejemplo: $3^3: 3^2 = 3^{3-2} = 3^1 = 3$

3. El producto de potencias del mismo exponente, es otra potencia que tiene el mismo exponente y, como base, el producto de las bases.

$$a^m \times b^m \times c^m = (a \times b \times c)^m$$

$$a^m \times b^m \times c^m = (a \times b \times c)^m$$
 Ejemplo: $2^3 \times 3^3 \times 10^3 = 60^3$

4. El cociente de potencias del mismo exponente, es otra potencia que tiene el mismo exponente y como base, el cociente de las bases.

$$a^m:b^m=(a/b)^m$$

Ejemplo:
$$12^3 : 3^3 = 4^3$$

5. La potencia de una potencia, es otra potencia que tiene la misma base y como exponente el producto de los exponentes.

$$\left(a^{m}\right)^{n}=a^{m\times n}$$

Ejemplo:
$$(3^3)^2 = 3^6$$

DIVISIBILIDAD



Un número es divisible por otro cuando la división del primero por el segundo es exacta

Múltiplos- Un número se dice que es múltiplo de otro cuando es el resultado de multiplicar Divisores-Se dice que un número es divisor de otro cuando lo divide exactamente Número primo- Es aquel que sólo es divisible por si mismo o por la unidad.

(Para averiguar si un número es primo se divide ordenadamente por todos los números primos menores que él. Cuando sin resultar divisiones exactas, se va a obtener un cociente menor o igual al divisor, se dice que el número es primo.)

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

Divisibilidad por 2- Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o cifra par

Divisibilidad por 3- Un número es divisible por 3 cuando lo es la suma de sus cifras

<u>Divisibilidad por 4</u>- Un número es divisible por 4 cuando las dos últimas cifras de la derecha son ceros o forman un número múltiplo de 4

Divisibilidad por 5- Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5

<u>Divisibilidad por 11</u>- Un número es divisible por 11 cuando lo es la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan el lugar par y la suma de las cifras que ocupan el lugar impar. También lo es cuando da 0.

<u>Divisibilidad por 10,100,1000....</u>- Un número es divisible por 10,100,1000... si termina en 1,2,3,...ceros , sucesivamente

MÁXIMO COMÚN DIVISOR

m.c.d. de varios números es el mayor número que divide a todos exactamente.

El m.c.d. es el producto de los factores comunes a todos los números con el menor exponente con que figuren.

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

m.c.m. es el producto de los factores comunes y no comunes al mayor exponente

REGLA DE LOS SIGNOS

RAZONES DE DOS NÚMEROS

Razón-Razón de dos números es el cociente indicado de ambos

Se compone de dos términos \underline{a} y \underline{b} de los cuales a es el denominador y b es el numerador. Razón de \underline{a} y b

 $\frac{a}{b}$

PROPIEDAD FUNDAMENTAL DE LAS RAZONES

 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \cdot d = b \cdot c$ El producto de los medios es igual al producto de los extremos



OPERACIONES CON FRACCIONES

SUMA/RESTA DE DOS O MAS FRACCIONES

$$\frac{1}{3} + \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$$

1) Hacemos mínimo común múltiplo de los denominadores:

ACADEMIA TAMARGO

$$6 = 2 \cdot 3$$

$$4 = 2 \cdot 2 = 2^{2}$$

$$5 = 5$$
m.c.m. = $2^{2} \cdot 3 \cdot 5 = 60$

2) PONEMOS EL M.C.M. COMO DENOMINADOR COMÚN A TODAS LAS FRACCIONES. Y DIVIDIMOS EL M.C.M. POR EL DENOMINADOR INICIAL DE CADA FRACCIÓN Y MULTIPLICAMOS POR EL NUMERADOR INICIAL DE CADA FRACCIÓN.

En nuestro ejemplo.

60:3 = 20 60:4 = 15 60:6 = 10

$$\frac{20 \cdot 1 + 15 \cdot 3 - 10 \cdot 5}{60}$$

3) OPERAMOS

$$\frac{20+45+50}{60} = \frac{115}{60} = \frac{23}{12}$$



MULTIPLICACIONES DE FRACCIONES

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2}$$

Multiplicamos los numeradores de cada fracción entre si y nos da el numerador de la fracción resultado a continuación multiplicamos los denominadores entre si y nos da el denominador de la fracción resultado.

$$\frac{2\cdot 4\cdot 1}{3\cdot 5\cdot 2} = \frac{8}{30}$$

En este caso podemos simplificar di entre 2 para que nos quede una fracción más manejable y nos quedaría $\frac{4}{15}$. Si nos damos cuenta esta operación ya la podíamos hacer antes ya que un 2 que multiplica y uno que divide se van.



DIVISIONES DE FRACCIONES

$$\frac{1}{3}:\frac{2}{5}$$

ACADEMIA TAMARGO

1) Multiplicas en cruz. Empiezas y acabas en el mismo lugar, imaginemos que es una bola de billar; Si empiezas por **el numerador** de la primera fracción vas al denominador de la segunda fracción "rebota" y llegas **al numerador** de la fracción resultado.

$$\frac{1}{3}$$
 $\frac{2}{5}$ = $\frac{1 \cdot 5}{3 \cdot 2} = \frac{5}{6}$

CALCULO DE FRACCIONES GENERATRICES

DECIMALES EXACTO

La fracción generatriz de un decimal exacto es una fracción que tiene por numerador al número, escrito sin coma decimal, y por denominador un uno seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene.

$$0,24 = \frac{24}{100}$$

DECIMALES PERIÓDICOS PUROS

Consideramos al decimal 4,31= 4,31313131, al que llamaremos x.

Si multiplicamos los dos miembros por 100 (un uno seguido de tantos ceros como cifras tiene el período) obtenemos:


Restando miembro a miembro las dos igualdades:

$$100x = 431'313131...$$

$$x = 4'313131...$$

$$99x = 431 - 4$$

La fracción generatriz de un decimal periódico puro es una fracción que tiene por numerador al propio número, escrito sin los signos coma y periodo, menos el número formado por las cifras anteriores a la coma. Por denominador tiene tantos nueves como cifras decimales hay en el periodo.



DECIMALES PERIÓDICOS MIXTOS

Consideramos el decimal 1,063 al que llamamos x:

X= 1,063636363....

ACADEMIA TAMARGO

Si multiplicamos los dos miembros por 10 (un uno seguido de tantos ceros como cifras decimales haya antes del periodo) obtenemos el decimal periódico puro:

10x= 10,63636363...

Multiplicamos los dos miembros de la igualdad obtenida por 100 (un unos seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el periodo) y obtenemos:

1000x= 1063,63636363...

Restando las dos últimas igualdades:

$$1000x = 1063'636363....$$
$$10x = 10'636363....$$
$$990x = 1063 - 10$$

$$x = \frac{1053}{990}$$

La fracción generatriz de un decimal periódico mixto es una fracción que tiene por numerador al propio número, escrito sin los signos coma periodo, menos el número formado por las cifras anteriores al periodo quitándole la coma. Por denominador tiene tantos nueves como cifras hay en el periodo seguidos de tantos ceros como cifras hay entre la coma y el periodo.

NUMEROS MIXTOS

Todas las fracciones mayores que la unidad se pueden expresar en forma de número mixto.

Hay dos casos:

• Primero. **Pasar de fracción a número mixto**. Ejemplo 8/5. Se hace la división 8:5= 1 y el resto es 3. Por tanto: 1 es el número natural y 3 es el numerador de la fracción y le denominador no cambia, es decir 5.

$$\frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$$

• Segundo: **Pasar de número mixto a fracción**. El numero natural se multiplica por el denominador y se suma el numerador. Ejemplo 1 + 2/3. Operamos: 1X3 = 3+2 = 5

$$1\frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$



JERARQUÍA DE LAS OPERACIONES

- 1. Paréntesis de los interiores a los exteriores
- 2. Potenciación y radicaciónsegúnencontremos de izquierda a derecha.
- 3. Multiplicación y divisiónsegúnencontremos de izquierda a derecha
- 4. Sumas y restas.

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando:

- I) A una cantidad determinada de la primera la corresponde una cantidad determinada de la segunda
- II) Al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por dicho número.

REGLA DE TRES DIRECTA

La regla de tres simple directa se fundamenta en una relación de proporcionalidad, por lo que:

$$\frac{B}{A} = \frac{Y}{X} = k \qquad \qquad X = \frac{A \cdot Y}{B}$$

Donde \mathbf{k} es la constante de proporcionalidad, para que esta proporcionalidad se cumpla tenemos que a un aumento de \mathbf{A} le corresponde un aumento de \mathbf{B} en la misma proporción.

B es a A directamente, como Y es a X, siendo X igual al producto de A porY dividido entre B.

MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES

Dos magnitudes son inversamente proporcionales, cuando:

- I) A una cantidad determinada de la primera le corresponde otra cantidad determinada de la segunda
- II) Al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por dicho número.

REGLA DE TRES INVERSA



En la regla de tres simple inversa, en la relación entre los valores se cumple que:

$$B \cdot A = X \cdot Y = e$$

$$X = \frac{B \cdot A}{Y}$$

Donde **e** es un producto constante, para que esta constante se conserve, tendremos que un aumento de **A**, necesitara una disminución de **B**, para que su producto permanezca constante, Y viceversa.

REPARTOS DIRECTAMENTE PROPORCIONALES

Repartir un número dado M en partes directamente proporcionales a varios dados a a \mathbb{Z} , a₃,------es hallar otros números b₁, b₂, b₃,------ proporcionales a ellos y cuyo total sea M

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3} = \dots = \frac{b_1 + b_2 + b_3 + \dots}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots} = \frac{M}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots}$$

REPARTOS INVERSAMENTE PROPORCIONALES

Repartir un número M, en partes inversamente proporcionales a varios dados a_1 , a_2 , a_3 ,... es hallar otros números b_1 , b_2 , b_3 ,.... inversamente proporcionales a ellos, y cuya suma sea M

$$\frac{b_1}{1 / a_1} = \frac{b_2}{1 / a_2} = \frac{b_3}{1 / a_3} = \dots = \frac{b_1 + b_2 + b_3 + \dots}{1 / a_1 + 1 / a_2 + 1 / a_3 + \dots} = \frac{M}{1 / a_1 + 1 / a_2 + 1 / a_3 + \dots}$$

PORCENTAJES

ÍNDICE DE VARIACIÓN: es el número por el que hay que multiplicar la cantidad inicial para obtener la cantidad final.

AUMENTOS PORCENTUALES: el índice de variación es la unidad seguida del aumento porcentual expresado en forma decimal.

Para calcular el valor final: valor final=valor inicial x índice de variación

DISMINUCIONES PORCENTUALES: el índice de variación es la unidad menos la disminución porcentual expresado en forma decimal.


Para calcular el valor final: valor final=valor inicial x índice de variación

ENCADENAMIENTO DE VARIACIONES PROCENTUALES: se multiplican entre sí los diferentes índices de variación

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

MEDIDAS DE LONGITUD

La unidad fundamental es el metro




ACADEMIA TAMARGO

disminuyen de 10 En 10 mm

MEDIDAS DE SUPERFICIE

La unidad fundamental es el metro cuadrado




La hectárea(ha) equivale al hectómetro cuadrado 1ha=1hm²= 10000m²

La área (a) equivale al decámetro cuadrado 1ª=1dam² La centiárea(ca) equivale al metro cuadrado 1ca=1m²

MEDIDAS DE VOLUMEN


La unidad fundamental es el metro cúbico




MEDIDAS DE CAPACIDAD

La unidad fundamental es el litro(I)






14



MEDIDAS DE PESO

La unidad fundamental es el gramo



RESOLUCIÓN ECUACIONES DE PRIMER GRADO

Regla de la suma: Si a los 2 miembros de una ecuación se le suma o resta el mismo número o la misma expresión a ambos lados de la igualdad la ecuación no varía.

Regla del producto: Si multiplicamos y dividimos los 2 miembros por un número distinto de 0, obtenemos una ecuación equivalente.

$$3x+2-x = 2x+8-6-5x-10$$
$$2x+2 = -3x-8$$

$$2x + 3x = -8 - 2$$

$$5x = -10$$
;

$$x = \frac{-10}{5}$$

$$x = -2$$

Operamos términos semejantes.

Términos con x a un lado de la igualdad y término independientes al otro. Los elementos que están sumando pasan restando y viceversa.

Operamos para dejar la incógnita sola, a un lado de la igualdad. El coeficiente que está multiplicando a la incógnita, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON DENOMINADORES.



1) hallamos el m.c.m. de los denominadores

$$\frac{3x+1}{2} - \frac{x-1}{3} + 2 = 27$$

$$m.c.m = 6$$

$$\frac{3(3x+1)}{6} - \frac{2(x-1)}{6} + \frac{12}{6} = \frac{162}{6};$$

 $7x = 145 \Rightarrow x = \frac{145}{7} \Rightarrow x = 20,71$

$$3(3x+1)-2(x-1)+12=162$$

$$9x + 3 - 2x + 2 + 12 = 162$$

- 2) dividimos el m.c.m. entre el denominador de cada fracción y lo multiplicamos por el numerador.
- 3) A partir de este momento ya se resuelve como una ecuación siguiendo los pasos anteriores.

AĈADEMIA MARGO S.L.U.

ACADEMIA TAMARGO

NOTA: Un número o signo delante de un paréntesis, afecta a todo el paréntesis.

FIGURAS PLANAS PROPIEDADES MÉTRICAS


PROPIEDADES MÉTRICAS DE LAS FIGURAS PLANAS.

-SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE UN POLÍGONO.

$$S = 180^{\underline{0}} \cdot (n-2)$$

-TEOREMA DE PITÁGORAS


El teorema de Pitágoras nos indica una relación que existe entre los cuadrados de los lados de un triángulo y el cuadrado de la hipotenusa.



La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa

$$h^2 = c_1^2 + c_2^2$$

-TRIÁNGULOS SEMEJANTES





Tienen dos ángulos correspondientes iguales.

Ejemplo:
$$\hat{A} = \hat{A}'$$
 y $\hat{B} = \hat{B}'$

2. Tienen un ángulo igual y proporcionales los lados que lo forman.

Ejemplo:
$$\hat{B} = \hat{B}'$$
 .Y $\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}}$


ACADEMIA TAMARGO

3. Tienen sus lados homólogos y proporcionales .

Ejemplo:
$$\frac{\overline{\overline{AB}}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}} = \frac{\overline{CA}}{\overline{C'A'}} = k$$

NOTA 1: k es la razón de semejanza, que es la constante de proporcionalidad entre sus lados. **NOTA2:** Si k es la razón de semejanza, en áreas es k² y en volúmenes k³

-TEOREMA DE TALES





$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \dots$$


La constante de proporcionalidad se denomina razón de semejanza.

Ejemplo:

Supongamos que la distancia AB es de 3 cm y que la distancia A'B' es de 1,5 cm, la razón sería $\frac{3}{1.5}$.

Ahora supongamos que la distancia entre BC es de 1 cm pues la distancia de B´C´ tiene que ser de 0,5. y la razón sería $\frac{1}{0.5}$. Podemos comprobar que $\frac{3}{1.5} = \frac{1}{0.5} = 2$.

Otro caso de teorema de Tales muy típico son los triángulos en posición de Tales, lógicamente se mantiene el mismo principio. Pero se cambia un poco la forma de enunciarlo. Todos los lados de un triángulo son proporcionales en la misma razón a los lados de sus triángulos semejantes. Por lo tanto yo puedo formar una proporción entre dos lados. Para entenderlo mejor, se hallará el valor de x en el siguiente triángulo, basándonos en el concepto previamente explicado.




ACADEMIA TAMARGO

$$\frac{x}{x+8} = \frac{4}{7} \to 7x = 4x + 32 \to 3x = 32 \to x = \frac{32}{3} = 10,\hat{6}$$

h

FIGURAS PLANAS






Ιb


$$S = lxl$$

<u>Triángulo</u>




 $S = \frac{bxh}{2}$

Rectángulo




<u>Paralelogramo</u>




S = bxh

Triángulo equilátero




 $S = l^2 \frac{\sqrt{3}}{4}$

<u>Rombo</u>



Trapecio

В



b

$$S = \left(\frac{B+b}{2}\right)xh$$

Polígonos Regulares


ap ap

ap= apotema

pe= perímetro (la suma de sus lados)

$$S = \frac{\text{pe} \cdot \text{ap}}{2}$$


Circunferencia y círculo




r= radio L= longitud de la circunferencia $L = 2\Pi r$




Sector Circular






$$S = \Pi(R^2 - r^2)$$

CUERPOS GEOMÉTRICOS





EXPRESIÓN GRÁFICA

DEFINICIONES PREVIAS

CONCEPTO DE FUNCIÓN

Función es una aplicación en la que se relaciona un conjunto inicial A (un conjunto cualquiera de números) y un conjunto final B que es el conjunto $\mathfrak R$ de los números reales.

$$A \xrightarrow{f(x)} E$$



El conjunto A se le denomina dominio o campo de existencia.

CONSTANTES Y VARIABLES

Constante: Es un valor fijo y determinado

ACADEMIA TAMARGO

Variables: Se designan por letras que pueden tomar distintos valores. Se clasifican en: independientes y dependientes.

Variables independientes: Representa a cualquier elemento del campo de existencia. (se suele representar por la letra "x")

Variables dependientes: Representa la imagen de x en el conjunto final. (se suele representar por la letra "y" o f(x))

Ejemplo:

Suponemos que el precio de las manzanas es de 2 Euros el kg. Y queremos hacer una función que nos de el coste en función del número de kilogramos que compró.

Kg. de frutas que compró → es la variable independiente "x"

Costes → es la variable dependiente "y" ("depende" del número de kg que compremos)

La función sería $y = 2 \cdot x$

Elijo comprar 6 kg., al sustituir la x por 6 nos da el coste $y = 2 \cdot 6 = 12$ euros

Esta función es de proporcionalidad directa $y = m \cdot x$ (pasa por el origen)

FUNCIÓN AFÍN

Se llama función lineal o función de primer grado, a toda expresión de la forma:

$$f(x) = mx + n$$

- 1) El valor de "m" se llama **pendiente de la recta** y depende del ángulo que forme con el eje x.
- 2) El valor de "n" se llama **ordenada en el origen** y define el punto en el que la recta corta al eje y.

(Su representación gráfica es siempre en una línea recta)

Ejemplo:
$$f(x) = 2x - 3$$

Se forma una tabla de valores sustituyendo los valores que nosotros asignemos a la variable "x" en la función. En este caso y = 2x - 3.

х	У
-1	-5

ACADEMIA TAMARGO

0	-3
1	-1
2	1
4	5

Quedándonos los puntos (-1,-5), (0,-3), (1,-1), (2,1), (4,5). Que a continuación los representamos:

NOTA: Recordemos que en las coordenadas de un punto siempre se pone primero el valor de la "x" que se representa en el eje de abscisas y después el de la "y" que se representa en el eje de ordenadas.

Figura 1 Representación de la función lineal f(x) = 2x - 3

